

Adfærdsforstyrrelser hos patienter med demens

Hvad er det?

BPSD = Behavioural and Psychiatric Symptoms in Dementia

Ses hos 90% på et eller andet tidspunkt af forløbet

Adfærdssymptomer:

- Aggression
- Apati
- Agitation
- Uro
- Råben

Psykiatriske Symptomer:

- Depression
- Angst
- Psykose

Apati

- Mangler initiativ
- Sidder uvirksom hele døgnet, hvis der ikke aktiveres

Råben

- Råber ofte "hallo" eller "hjælp" uden nogen påviselig årsag
- Ved det ofte ikke selv

Uro

Mange former:

Vandren op og ned af gangene

Ambuleringen (vil forlade hjemmet)

Pilleri

Agitation

- Uhensigtsmæssig adfærd der ikke har sammenhæng med de behov patienten har
- Rastløshed
- Ængstelse
- Hyperaktivitet

Aggression

Agression er:

- Verbale trusler
- Fysiske trusler – spark eller niv
- Slår på mennesker eller ting
- Overreaktion på selv små hændelser

Agression

Årsager:

- Somatisk sygdom
- Depression
- Frygt eller ydmygelse
- Frustration over ikke at forstå eller blive forstået
- Manglende dømmekraft eller selvkontrol på grund af demenssygdom
- Manglende hæmninger - Emma Gad væk

Agression

Vigtigst:

Tag det ikke personligt !!

Det er som regel kun rettet mod dig, bare fordi du er til stede

Søvn

Søvnmønsteret ændres med alderen, men forstyrrelser er hyppigere og mere alvorlige hos patienter med AD

Mange somatiske lidelser påvirker også søvnen

Circadiane rytme – det biologiske ur – er forstyrret hos patienter med AD

Skyldes formentlig tab af kolinerge neuroner

Observationer

Kortlæg:

- Søvn mønster – døgnrytmeskema
- Somatisk undersøgelse (smerter, luftveje, hjerte, prostata)
- Psykisk (delir, depression, angst)
- Medicin gennemgang
- Dagaktiviteter

Bivirkninger ved antipsykotisk behandling

- Parkinsonistiske symptomer
- Sløvhed
- Gangforstyrrelser
- Fald
- Delir
- Lunge – og urinvejsinfektioner
- Perifere ødemer
- Cerebrovaskulære hændelser
- Fald i kognitive funktioner
- Øget dødelighed som følge af pneumoni, apoplexi og akutte kardiale arytmier

Bivirkninger ved antipsykotisk behandling

Nyt studie viser:

- Serenase øger dødeligheden med 50% i forhold til Risperdal
- Den øgede dødelighed ses indenfor de første 3 måneders behandling
- Ca 30 ekstra tilfælde af apopleksi og ca 25 ekstra dødsfald årligt blandt mennesker med demens i Danmark